



VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS

2022-03-03, Nr. AL-1

Šis autorizacijos liudijimas išduotas UAB „Ekochemeta“, Akademijos g. 7, 08412, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Gamintojas – UAB „Ekochemeta“, Akademijos g. 7, LT-08412, Vilnius, Lietuvos Respublika.

18 produktų tipas. Veterinarinės paskirties insekticidas.

CIPPER 200, skystis

Veiklioji medžiaga – (RS)- α -ciano-3 fenoksibenzil-(1RS)-cis trans-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2 imetilciklopropankarboksilatas (cipermetrinas) (CAS Nr. 52315-07-8, EB Nr. 257-842-9) – 10 %.

Paskirtis – skraidantiems ir ropojantiems vabzdžiams naikinti gyvūnų laikymo vietose.

Pakuotė – rudo stiklo buteliukai po 10, 100, 500 ir 1000 ml su užsukamais kamšteliais ir didelio tankio polietileno talpyklė po 5 l su užsukamu kamštelium.

Veterinarinio biocidinio produkto autorizacija Lietuvos Respublikoje pratęsta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. B1-105 ir jam suteiktas autorizacijos numeris **LT/ABPV/2022/0251**.

Veterinarinio biocidinio produkto autorizacijos liudijimas galioja nuo 2022-03-03 iki 2027-03-03.

Šio liudijimo galiojimas gali būti panaikintas, nepasibaigus galiojimo terminui, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. I) reikalavimai.

PRIEDAI:

1. Biocidinio produkto veikliųjų medžiagų gamintojai, 1 lapas.
2. Biocidinio produkto ženklavimas ir naudojimo instrukcija, 3 lapai.

Direktorius

A. V.

Mantas Staškevičius

PRIVALOMA VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODUKTO ŽENKLINIMO IR NAUDOJIMO INFORMACIJA

CIPPER 200, skystis

Paskirtis

18 tipo PT veterinarinis biocidinis produktas – skraidantiems ir ropojantiems vabzdžiams naikinti gyvūnų laikymo vietose.

Veiklioji medžiaga

Cipermetrinas (CAS Nr. 52315-07-8; EB Nr. 257-842-9) – 10 %.

Sudėtyje yra: Solventnafta (nafta), lengvoji, aromatinė; alkoholiai, C12-13, etoksilinti; kalcio dodecilbenszensulfonatas.

Naudojimo nurodymai

Prieš naudojimą visada perskaitykite etiketę ir produkto naudojimo instrukciją ar informacinį lapelį. Skirtas tik profesionaliems naudotojams.

Insekticidas neskirtas naudoti visuomeninės paskirties vietose, taip pat augalams ir augaliniams produktams apsaugoti. Labai toksiškas bitėms, žuvims, vėžiagyviams, ropliams. Prieš naudojimą būtina perskaityti pridedamą informacinį lapelį ir saugos duomenų lapą.

Draudžiama naudoti ne pagal naudojimo instrukciją, naudoti neskiestą, pilti ant dirvožemio, naudoti netoli bičių avilių ir vandens telkinių, purkšti ar tepti ant gyvūnų.



PAVOJINGA Degūs skystis ir garai. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Kenksminga prarijus. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Smarkiai pažeidžia akis. Dirgina odą. Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo atviros liepsnos/karštų paviršių. Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Neįkvėpti garų / aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. NESKATINTI vėmimo. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Laikyti užrakintą. Produkto likučius nukenksminti informaciniame lapelyje nurodytu būdu ir talpyklą išmesti į plastiko atliekoms rinkti skirtą konteinerį arba sudeginti, jeigu yra insekticido likučių.

Informacija gydytojui: specialių priešnuodžių nėra, turi būti taikomas simptominis gydymas.

Informacija apsinuodijus tel. +370 5 236 20 52.

Veterinarinio biocidinio produkto autorizacijos Nr. LT/ABPV/2022/0251

Autorizacijos liudijimo turėtojas ir gamintojas - UAB „EKOCHMETA“, Akademijos g. 7, LT-08412 Vilnius

Tinkamumo laikas XXX

Serijos Nr. XXX

Pakuotė XXX

Naudojimo instrukcija / Informacinis lapelis

Cipper 200, skystis

18 PT veterinarinis biocidinis produktas – insekticidas – akaricidas skraidantiems ir ropojančiams vabzdžiams naikinti gyvūnų laikymo vietose. Skirtas profesionaliam naudojimui.

Veiklioji medžiaga: cipermetrinas (*cis/trans* +/- 40/ 60), (CAS Nr. 52315-07-8; EB Nr. 257-842-9) – 10 %.

Kiti komponentai: emulsikliai (nejoninės ir anijoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos – iki 10 g/ 100 ml; solventnafta (nafta), lengvoji, aromatinė – iki 100 ml.

Insekticidas neskirtas naudoti visuomeninės paskirties vietose, taip pat augalams ir augaliniam produktams apsaugoti. Labai toksiškas bitėms, žuvisms, vėžiagyviams, ropliams. Prieš naudojimą būtina perskaityti pridedamą informacinį lapelį ir saugos duomenų lapą. Draudžiama naudoti ne pagal naudojimo instrukciją, naudoti neskiesta, pilti ant dirvožemio, naudoti netoli bičių avilių ir vandens telkinių, purkšti ar tepti ant gyvūnų.

Atskiestas vandeniu insekticidas naudojamas fermose, tvartuose, kiaulidėse, paukštidėse ir kitose uždaroje patalpose.

Atsargiai! Net darbinės emulsijos gali sukelti alergiją. Mūvėti vandeniu nelaidžias pirštines. Purškiant naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonės – respiratorius, apsaugančius nuo skystų aerozolių, pvz., FFP2SL arba FFP1SL pagal EN 149.

Darbinių emulsijų paruošimas ir naudojimas

Insekticidas naudojamas atskiestas su vandeniu ir vandens emulsiją kruopščiai išpurškiant ant ekto parazitų susikaupimo vietų.

Darbinės emulsijos gaminimas: pakuotė su insekticido koncentratu pakratoma, pagal normą paskaičiuotas insekticido kiekis supilamas į šaltą vandenį ir gerai išmaišoma. Emulsijos gali būti gaminamos tiek plastikinėse, tiek ir metalinėse talpose. Paruošta emulsija purškiama arba užtepama ant apdorojamų vietų. Specialių reikalavimų purkštuvams nėra. **Paruoštą emulsiją sunaudoti per 20 valandų. Emulsiją draudžiama pilti į kanalizaciją, ant dirvožemio ar į vandens telkinius** – iš anksto neruošti didelio emulsijos kiekio. Dirbant rekomenduojama emulsiją pastoviai pamaišyti.

Koncentrato ir darbinių emulsijų nukenksminimas: į tarą su produkto likučiais įpilti 300 – 500 g gesintų kalkių ar kalcinuotos sodos 10 l vandens. Supiltas minėtas tirpalas paliekamas 6 – 12 valandų. Po to gerai praskalaujama vandeniu. Panaudotą tarą draudžiama naudoti maisto produktų, geriamo vandens ar pašarų laikymui.

Blusų naikinimas. 0,05 % Cipper 200 vandens emulsija (5 ml insekticido išmaišoma 10 l vandens) – purškiamos grindys ir sienos iki 1 m aukščio, gyvūnų guoliai ir aplink juos (norma – 50 ml/m²).

Skrudėlių ir blakių naikinimas. 0,1 % koncentracijos emulsija (10 ml insekticido išmaišoma 10 l vandens) – purškiamos skrudėlių susitelkimo vietos ir jų judėjimo takai (50-100 ml/m²).

Tarakonų naikinimas. Jis atliekamas išpurškiant 0,1 % koncentracijos emulsiją (10 ml / 10 l vandens) grindis, sienas, plyšius, užkaborius, patalpos kampus, ant durų, langų rėmų, apie šiukšlių dėžes, praustuvus, kanalizaciją, vandens čiaupus (norma – 50 ml/m²). Skysčius įgeriančius paviršius rekomenduojama apdoroti 1-2 % koncentracijos emulsija (100 – 200 ml / 10 l vandens), norma – 500 - 1000 ml/m².

Erkių naikinimas. 0,2 % (20 ml / 10 l vandens) koncentracijos vandens emulsija purškiamos grindys, lubos, sienos, norma – 50 ml/m².

Musių naikinimas. 0,05 % koncentracijos Cipper 200 (5 ml / 10 l vandens) vandens emulsija purškiamos sienos, lubos, grindys, langų rėmai, norma - 100 ml/m². Vėl atsiradus skraidančioms

musėms, procedūra kartojama. Musių lervos naikamos jų veisimosi vietose kas 20 – 30 dienų purškiant substrato paviršių 0,1 % emulsija, norma – 3 l/m², esant gyvulių mėšlui – norma iki 2 l/m². **Uodų naikinimas.** Naudojama 0,025% (2,5 ml / 10 l vandens) emulsija. Išpurškiamos sienos, lubos, grindys (50 - 100 ml/m²). Procedūra kartojama atsiradus skraidantiems uodams.

Atliekant dezinfekciją purškimo būdu, kol patalpos nebus gerai išvėdintos, negali būti pašalinių asmenų ir gyvūnų. **Vengti patekimo į vandenį, gyvulių šėrimo vietų ir ant pašarų.** Apipurkšta vieta turi būti tolygiai drėgna. Po darbo išvėdinti patalpas.

Pastebėjus kenkėjų, po 3 – 4 sav. purškiama pakartotinai. Lauke purkšti gali tekti dažniau.

Toksiškas žuvims, vėžiagyviams, bitėms ir kitiems naudingiems vabzdžiams. Nenaudoti prie vandens telkinių.

Laikymas: sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, atokiau nuo maisto produktų, pašarų ir tiesioginių saulės spindulių. Sandėliavimo temperatūra nuo -5 °C iki + 40 °C.

Veterinarinio biocidinio produkto autorizacijos Nr. LT/ABPV/2022/0251

Autorizacijos liudijimo turėtojas ir gamintojas - UAB „EKOCHMETA“, Akademijos g. 7, LT-08412 Vilnius

Tinkamumo laikas XXX

Serijos Nr. XXX

Pakuotės po XXXX